



ALCUNE CONDIZIONI DI TEMPORANEA ESCLUSIONE DALLA DONAZIONE

1 anno	Gravidanza - 1 anno dopo il parto.
	Vaccinazione anti- rabbica se praticata dopo esposizione.
6 mesi	Mononucleosi, dopo la guarigione
	Toxoplasmosi, dopo la guarigione
	Interruzione di gravidanza
	Soggiorno in zone malariche
4 mesi	Trasfusione di sangue e/o emocomponenti o trattamento con farmaci emoderivati (es: immunoglobuline antitetaniche)
	Esame endoscopico con strumenti flessibili
	Interventi chirurgici maggiori
	Rapporti sessuali con persone infette o a rischio maggiore di infezione da HBV, HCV, HIV
	Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie infettive
	Agopuntura (se non praticata da un professionista abilitato e con dispositivi a perdere)
	Tatuaggi, piercing
3 mesi	Viaggi in zone endemiche per malattie tropicali
28 giorni	soggiorno nelle aree dove si sono registrati casi autoctoni d'infezione da Zika virus (Brasile, Colombia, Suriname, Guatemala, El Salvador, Indonesia-Isola di Sulawesi, Capo Verde, Messico, Panama, Paraguay, Venezuela, Honduras, Guyana Francese, Martinica, Porto Rico, Guyana, Haiti, Saint Martin, Barbados, Bolivia, Ecuador, Guadalupa, Repubblica Dominicana, Thailandia, Isole Vergini Americane, Nicaragua e Isole del Pacifico).
da 48 ore a 4 settimane	Vaccinazioni - Periodo variabile a seconda del tipo
1 settimana	Intervento chirurgico minore
48 ore	Cure odontoiatriche - cure di minore entità da parte di dentista o odontoiogenista (l'estrazione, la devitalizzazione ed interventi analoghi sono considerati interventi chirurgici minori).
variabile	Assunzione di farmaci - rinvio per un periodo variabile di tempo secondo il farmaco assunto e la patologia oggetto di cura.
	Malattie Allergiche - sospensione nel periodo sintomatico.
N.B.	evitare la donazione durante il ciclo mestruale

Comunque il periodo di sospensione può essere variabile a discrezione del giudizio clinico del medico

ALCUNE CONDIZIONI DI PERMANENTE ESCLUSIONE DALLA DONAZIONE

Malattie infettive: Epatite C, Epatite B, HIV1-2, HTLV I/II, Babebiosi, Lebbra, Kala Azar (Leishmaniosi viscerale), Tripanosoma Cruzi (M. di Chagas), Sifilide, Epatite ad eziologia indeterminata.
Soggiorno in Gran Bretagna per 6 mesi cumulativi dal 1980 al 1996 per rischio Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile
Rapporti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie infettive (es. occasionali, promiscui, ...)
Ricevimenti xenotrapianti.
Malattie autoimmuni ad esclusione della malattia celiaca purché il donatore segua una dieta priva di glutine.
Tendenza anomala all'emorragia.

È doveroso autoescludersi dalla donazione per: assunzione di droghe, alcolismo, rapporti sessuali a rischio, malattie veneree, positività ai test di sifilide (TPHA o VDRL), AIDS (anti-HIV 1), epatite B (HBsAg), epatite C (anti-HCV), rapporti sessuali con persone nelle condizioni incluse nell'elenco